

品質評価基準

17 シュッコンカスミソウ

項目	判定基準	備考
小花の褐変 (黒花)	A: 発生なし, 開花小花のうち, C : 数花, D : 1/3, E : 1/2, F : ほぼ全 花	花弁が萎凋し, 溶けたようにがく片中 にしぼみ込み黒くなった小花で, 高温 下で発生多
小花の乾燥	A: 発生なし, 開花小花の, B: 数花 C : 1/3, D : 1/2, E : ほぼ全花	形をとどめてドライフラワー状になった 小花
茎の軟弱化	A: かたい, B: ややしなる, C : しだれる, D : 大きくしだれる, 折れる	‘ブリストル・フェアリー’で発止しやす い
開花	つぼみの開花がみられない場合に チェック	
葉・茎の黄変	発生が認められた場合にチェック	
葉の萎れ	発生が認められた場合にチェック	
軟弱茎	評価開始時にチェック	
その他	小花柄の萎れ, 薬害, 虫害など	

シュッコンカスミソウ品質チェックシート

個体番号	市場 項目	品種		産地		評価開始日					備考 (メモ)	
		0	2	4	6	8	経過日数					
1	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
2	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
3	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
4	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
5	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
6	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
7	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
8	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
9	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											
10	黒花											
	小花の乾燥											
	開花											
	葉・茎の黄変											
	茎の軟弱化											
	その他のチェック											

重量測定を行う場合には開花率の測定は不要